


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1. Джгут для зупинки кровотечі. Джгут накладають не більш як на 1-1,5 години в теплу пору року, а в холодну – не більше, як на 1 годину, інакше може виникнути омертвіння кінцівки. Джгут повинен накладатися туго, але не слід надмірно стискати тканини кінцівок, так як можливі важкі ускладнення; до джгута обов'язково прикріплюють аркуш паперу з поміткою часу його накладання.
2. Бинт стерильний та нестерильний. Накладання пов'язок, зупинення кровотечі.
3. Вата нестерильна, медична - призначена для медичних маніпуляцій, пов'язаних з обробкою ран.
4. Пакет стерильний перев'язувальний - готова стерильна пов'язка, яка служить для накладення на рану з метою зупинки кровотечі та захисту рани від проникнення інфекції.
5. Розчин йоду 5% - застосовують зовнішньо як антисептичний, подразнювальний засіб при інфекційно-запальних захворюваннях шкіри та слизових оболонок, для обробки операційного поля, для профілактики інфікування невеликих ушкоджень цілісності шкіри, для зменшення запальних процесів при міозитах.
6. Розчин брильянтовий зелений - піодермія; інші гнійно-запальні процеси шкіри, обумовлені патогенною мікрофлорою; блефарит; для обробки операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.
7. Перекис водню - препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, а також при гнійних ранах.
8. Розчин аміаку 10 % - інгаляційно - збудження дихання і виведення з непритомного стану; внутрішньо як блювотний засіб; зовнішньо - укуси комах.
9. Кислота борна 3% - для нейтралізації місця ураження при опіках лугами.

10. Настойка валеріани - функціональні розлади діяльності центральної нервової системи, серцево-судинної системи; спазми органів шлунково-кишкового тракту.
11. Анальгін - больовий синдром малої і середньої інтенсивності різного походження і локалізації (головний, зубний біль, опіки).
12. Ацетилсаліцилова кислота - лікування легкого та помірно вираженого, гострого больового синдрому (головний, зубний біль, біль у суглобах та зв'язках, біль у спині). Симптоматичне лікування гарячки та/або больового синдрому при застудних захворюваннях.
13. Нітрогліцерин - усунення нападів стенокардії.
14. Цитрамон - терапія слабкого або помірного больового синдрому при головному або зубному болю, мігрені.
15. Парацетамол - больовий синдром слабкої та помірної інтенсивності різного генезу (головний біль, мігрень, зубний біль, невралгія, біль при травмах, опіках). Лихоманка при інфекційно-запальних захворюваннях.
16. Валідол - напади стенокардії легкого ступеня тяжкості, морська та повітряна хвороби, істерія, невроз, головний біль, пов'язаний із застосуванням нітратів.
17. Пластир бактерицидний - для закриття місць ін'єкцій, а також для надання першої медичної допомоги при подряпинах шкіри, невеликих ранах та порізах.
18. Корвалол - - неврози з підвищеною дратівливістю, не різко виражені спазми коронарних судин, тахікардія, спазми кишечника (як спазмолітичний лікарський засіб).
19. Лоперамід - симптоматичне лікування гострої діареї у дорослих та дітей віком від 12 років.
20. Активоване вугілля - гострі отруєння побутовими, промисловими та харчовими отрутами, лікарськими препаратами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів; диспепсія, метеоризм, харчові токсикоінфекції.

Фельдшер пункту охорони здоров'я



К. Л. Сердюк